

Hastanın Adı Soyadı :
Yaş - Cinsiyet :
Protokol No. :
Tarih :

Bilateral Alt Ekstremitte Derin ve Yüzeyel Venöz Sistem Doppler US incelemesinde:

Derin Venöz Sistem Doppler US;

Her iki eksternal iliak, ana, derin ve yüzeyel femoral venlerin genişlikleri, duvar kalınlıkları tabii olup, gri skala incelemede lümenleri anekoiktir. Tibialis anterior ve posterior venler tabiidir. Augmentasyona ve kompresyona yanıt tüm venöz sistem düzeyinde doğaldır. Venlerde dolum tam olup, tromboz lehine bulgu saptanmamıştır.

Yüzeyel Venöz Sistem Doppler US;

Eksternal iliak, ortak femoral, yüzeyel femoral Ven düzeyinde derin inspirasyon ve takiben valsalva ile ile reflü akım izlenmedi.

Vena safena magnalar (VSM) ana femoral vene drene olduğu yerden distale kadar renkli akım değerlendirmesinde dolum defekti saptanmamıştır.

Sağ safenofemoral bileşke (SFJ) mm, sol SFJ mm olup derin inspirasyon ve takiben valsalva ile reflü akım izlenmedi.

Sağ VSM proksimalinde mm, diz üstü seviyede mm, diz altı seviyede mm, bilek düzeyinde mm ; sol VSM proksimalinde mm, diz üstü seviyede mm, diz altı seviyede mm, bilek düzeyinde mm olarak ölçülmüş olup derin inspirasyon ve takiben valsalva ve augmentasyon ile reflü akım izlenmedi.

Her iki tarafta vena safena magna ve parva segmentleri tabii kalibrasyonda olup reflü akım izlenmemiştir.

Yetmezlik bulgu olan perforan veya komminikan venöz dal izlenmedi.

Tromboflebit, cilt altı ödem lehine sonografik bulgu izlenmemiştir.

SONUÇ: Normal sınırlarda yüzeyel ve derin venöz sistem inceleme.